

Impfkalender für Kinder, Jugendliche und Erwachsene im Freistaat Sachsen (Stand 01.01.2024)

| Impfstoff [#] | Alter | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------------------------------|-----------|--|--------|--------|-----------|--|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|-------------------|-----------|-----------|---------------|---|-------------------|
| | post-natal | 6 Wo. | 2 Mon. | 3 Mon. | 4 Mon. | 6 Mon. | 11 Mon. | 12 Mon. (1 Jahr) | 14 Mon. | 23 Mon. | 4 Jahre | 5 Jahre | 9 Jahre | 10 Jahre | 25 Jahre | ≥50 Jahre | ≥60 Jahre | alle 10 Jahre | | |
| HBV HAV | HBV1 ► HBV2 (Abstand > 4 Wochen) | | | | | | HBV3/4 und HAV1 ► HAV2 (Abstand 6-12 Monate) oder HAV/HBV1 ► HAV/HBV2 (Abstand > 4 Wochen) ► HAV/HBV3 (Abstand 6-12 Monate) | | | | | | | | | | | | | |
| DTPa* Tdap | | | DTPa1 | DTPa2 | DTPa3 | | | DTPa4 | | | | DTPa5 | | Tdap | | | | | Tdap | |
| Hib* | | | Hib1 | * | Hib2 | | | Hib3 | | | | | | | | | | | | |
| Polio (IPV)* | | | IPV1 | * | IPV2 | | | IPV3 | | | | | | IPV4 | | | | | IPV | |
| MMR | | | | | | | MMR1 | | MMR2 | | | | | | MMR3 [‡] | | | | | |
| VZV | | | | | | | VZV1 | | VZV2 | | | | | | | | | | | |
| Men B | | | Meningokokken B | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Men ACWY | | | Meningokokken ACWY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Influenza** | | | | | | Influenza | | | | | | | | | | | | | | |
| COVID-19** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | COVID-19 | |
| Pneumo- kokken*** | | | PCV1 ► PCV2 (Abstand >2 Monate) ► PCV3 (Abstand >7 Monate) | | | | | | | | | | | | | | | | | Pneumo- kokken |
| Rota- viren | | Rotaviren | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HPV*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ≤ 14 J. HPV1 ► HPV2 ≥ 15 J. HPV1 ► HPV2 ► HPV3 | |
| Herpes zoster*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | RZV1 ► RZV2 (Abstand > 6 Mon.) | |

- # für die jeweiligen Impfstoffe unbedingt die Fachinformation sowie die nachstehenden Tabellen mit Hinweisen zu Applikation und Impfabständen beachten!
- ‡ alle empfänglichen Personen (s. nachstehende Tabellen)
- * bei Antigenkombinationen, die eine Pertussis-Komponente enthalten, sind drei Injektionen im Säuglingsalter erforderlich; bei reifgeborenen Säuglingen kann bei Anwendung von 6- oder 5-fach-Impfstoffen die im Alter von 3 Monaten vorgesehene 2. Impfung entfallen (sog. 2 + 1 Schema)
- ** jährliche saisonale Auffrischung mit einem an die zirkulierenden Virusvarianten (COVID-19) bzw. Stamm-angepassten (Influenza)-Impfstoff
- *** präferentiell sind folgende Impfstoffe empfohlen: Pneumokokken (ab 18 Jahren): 20-valenter Konjugatimpfstoff (PCV20), HPV: 9-valenter Impfstoff; Herpes zoster: rekombinanter, adjuvantierter Impfstoff (RZV)